


Perché riorganizzare la rete perinatale: dal punto di vista della sicurezza dei bambini



Rischi legati alla nascita

- Morte
- Danno neurologico permanente
- Prematurità

Mortalità perinatale (per mille)



Rischi legati alla nascita

- Mortalità
- Danno neurologico permanente
- Prematurità

Asfissia al momento del parto


- Si verifica **4-8 volte ogni 1000 parti**
- Una **rianimazione rapida e efficace** riduce morte e paralisi cerebrale a distanza nel bambino
- Gran parte del futuro del bambino si gioca nel primo minuto dopo la nascita (definito il **“minuto d’oro”** o **“un minuto per la vita”**)
- Richiede il lavoro coordinato di più persone

Il volume di attività dei
professionisti sanitari,
esattamente come in ambito
chirurgico, condiziona il risultato
delle cure?


Finlandia

(180.368 nascite in 5 anni, 1734 nati in media per punto nascita)

mortalità neonatale




Finlandia: frattura di clavicola al parto



Germania (Regione di Hesse):


598.570 nascite da gravidanza fisiologica in 11 anni

mortalità neonatale




Norvegia (1.250.000 nati tra il 1972 e il 1995)

mortalità neonatale



California 488.622 nati nel 2006

asfissia al parto




Numero parti/anno

**LA PROVA DEL NOVE: MA DOVE SI
E' CHIUSO COSA E' ACCADUTO?**

Portogallo: dal 1989 al 2003 si è passati da 200 a 51 punti nascita

Mortalità perinatale



British Columbia, **Canada**

	Comunità senza chiusura	Comunità con chiusura (dal 1998)
N° ospedali	12	21
Distanza ospedale più vicino di livello superiore, <i>km</i>	107 (64-148)	79 (41-128)
Tempo di percorrenza, <i>min</i>	72 (58-102)	58 (34-110)

CMAJ 2017 March 20;189:E431-6. doi: 10.1503/cmaj.160461


British Columbia, **Canada**

	Comunità senza chiusura	Comunità con chiusura (dal 1998)
N° ospedali	12	21
Distanza ospedale più vicino di livello superiore, <i>km</i>	107 (64-148)	79 (41-128)
Tempo di percorrenza, <i>min</i>	72 (58-102)	58 (34-110)

CMAJ 2017 March 20;189:E431-6. doi: 10.1503/cmaj.160461


British Columbia, Canada

mortalità perinatale



British Columbia, Canada


numero di parti



Rischi legati alla nascita

- Mortalità
- Danno neurologico permanente
- Prematurità

518 nati $34^{+0}-36^{+6}$ in *Spoke* nel 2016



Problematiche cliniche nei neonati Late-Preterm

❖ Fase di transizione

- Più difficoltoso adattamento alla nascita
- Instabilità termica

❖ Fase neonatale precoce

- Difficoltà respiratorie
- Ipoglicemia
- Difficoltà alimentari
- Ittero
- Apnea
- Infezioni

❖ Periodo Neonatale tardivo

- Scarsa alimentazione, disidratazione
- Più frequenti riammissioni in ospedale

❖ Prima Infanzia

- Maggiore rischio di morte in culla

❖ Problemi a distanza


- Difficoltà di apprendimento, fallimenti scolastici
- Problemi comportamentali

¹ *Late Preterm Birth: Every Week Matters, Medical Perspectives on Prematurity. Prepared by the Office of the Medical Director, March of Dimes. March 2006.*

² *Late Preterm Infant Assessment Guide, Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN)*

³ *NICHD Workshop: Optimizing Care and Long-term Outcome of Near-term Pregnancy and Near-term Newborn Infant. July 18-19. Bethesda, MD, 2005.*

Esistono attualmente in Italia circa 14000 pediatri



Visto che questo numero non copre neanche i pensionamenti dei pediatri di libera scelta, esiste il concreto rischio, per effetto anche di un già registrato spostamento di pediatri dalla rete ospedaliera a quella della pediatria di libera scelta, di una carenza di professionisti in ambito ospedaliero. La difficoltà di coprire il turnover di pediatri ospedalieri è d'altronde già presente e drammatica in gran parte della nostra Regione.

Professionisti
del settore
sanitario

Politici



..far sì che tutte le coppie mamma-
bambino possano accedere ai
migliori servizi possibili